

Datos del Producto

Número de Registro: 18767 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 08/10/1991 **Renovación:** 11/06/2013 **Caducidad:** 15/03/2026
Nombre Comercial: SCORE 25 EC

Titular

SYNGENTA ESPAÑA, S.A.

 C/ Ribera del Loira 8-10, 3ª planta

 28042 Madrid
 (Madrid)

 ESPAÑA

Fabricante

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

 Rosentalstrasse 67

 4058
 (Basilea)

 SUIZA

Composición

DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V

Envases

Envases para uso profesional desde 5 ml a 20 litros y para jardinería exterior doméstica desde 5 ml hasta 500 ml.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Condic. Especifico |
|---------------|--|----------------|---|
| Albaricoquero | Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> Monilia, <i>Monilinia</i> spp. | | |
| | Oídio del albaricoquero, <i>Podosphaera tridactyla</i> Oídio del rosal, <i>Podosphaera pannosa</i> | 0,03 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña en floración con un intervalo de 7-14 días en un volumen de caldo entre 500-2.200 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. |
| Alcachofa | Oídio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i> | 0,05 - 0,064 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 12 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| | <i>Colletotrichum</i> spp. | | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Contra antracnosis (<i>Colletotrichum</i> spp.). Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días desde BBCH 69 (fin de la floración) a BBCH 79 (Frutos alcanzan alrededor del 90 % del tamaño varietal final) en un volumen de caldo entre 800-900 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| | Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> | | |

| | | | |
|-----------|---|----------------|--|
| | Mancha ocre del almendro, <i>Polystigma ochraceum</i> Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Moteado del melocotonero, <i>Venturia carpophila</i> Roya del ciruelo, <i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> | | |
| Almendro | Septoriosis, <i>Septoria</i> spp. | 0,05 % | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días desde BBCH 69 (fin de la floración) a BBCH 79 (Frutos alcanzan alrededor del 90 % del tamaño varietal final) en un volumen de caldo entre 800-900 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Apio | Septoriosis del apio, <i>Septoria apiicola</i> | 0,3 - 0,5 l/ha | Aire libre. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 300-800 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Brécol | Mancha negra, tizón de las crucíferas, <i>Alternaria brassicae</i> | 0,05 - 0,064 % | Aire libre. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| | <i>Alternaria</i> spp. | 0,015 % | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Efectuar un máximo 4 apl./campaña con un intervalo entre aplicaciones de 10 días a partir del hinchado de las yemas hasta que el fruto alcance 1 cm de diámetro y 12-18 días en estadios posteriores (BBCH: 74-81), en un vol. de caldo de 2.000 l/ha. No superar un gasto de 0,3 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Caqui | Manchas circulares del caqui, <i>Plurivorosphaerella nawae</i> | 0,02 - 0,045 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña en floración con un intervalo de 15-20 días en un volumen de caldo entre 500-2.200 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. |
| Cardo | Septoriosis, <i>Septoria</i> spp. | 0,3 - 0,5 l/ha | Aire libre. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 300-800 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Cerezo | Monilia, <i>Monilinia</i> spp. | 0,03 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-21 días, en un volumen de caldo entre 800-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. |
| Chirivía | <i>Alternaria</i> spp. | 0,03 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10-15 días, en un volumen de caldo entre 100-500 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| | Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Oídio del albaricoquero, <i>Podosphaera tridactyla</i> Oídio del rosál, <i>Podosphaera pannosa</i> | 0,03 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días, en un volumen de caldo entre 800-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. |
| Ciruelo | Roya del clavel, <i>Uromyces dianthi</i> | 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 500-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Dalia | Oídios, <i>Erysiphaceae</i> | 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 500-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| | Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Oídio del albaricoquero, <i>Podosphaera tridactyla</i> | 0,03 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días, en un volumen de caldo entre 800-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. |
| | <i>Alternaria</i> spp. Estemfilosis, mancha negra, <i>Stemphylium vesicarium</i> Roya del espárrago, <i>Puccinia asparagi</i> | 0,3 - 0,5 l/ha | Aire libre. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 300-1.250 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. Aplicación limitada a la campaña anterior. |
| | Antracnosis del fresón, <i>Colletotrichum acutatum</i> Antracnosis, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Oídios, <i>Erysiphaceae</i> Roya del frambueso, <i>Pucciniastrum americanum</i> | 0,02 - 0,05 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días, en un volumen de caldo entre 500-1.200 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Frambueso | Oídio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i> | 0,02 - 0,05 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días, en un volumen de caldo entre 500-1.200 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Fresal | Ascoquitosis del guisante, <i>Didymella pinodes</i> Rabia del guisante, <i>Ascochyta pisi</i> | | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10-12 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|
| Guisante verde | Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | 0,05 - 0,064 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10-12 días, en un volumen de caldo entre 500-1.200 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Haba verde | Mycosphaerella spp. Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | 0,05 - 0,064 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10-12 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Hinojo | Ramularia spp. | 0,5 l/ha | Aire libre. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 8 días, en un volumen de caldo entre 600-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Judía verde | Mycosphaerella spp. Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides | 0,05 - 0,064 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10-12 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Lechuga y similares | Alternaria spp. | 0,05 - 0,08 % | Aire libre. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 500-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Manzano | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0,015 % | Efectuar un máximo de 4 apl./campaña con un intervalo de 10 días a partir del hinchado de las yemas hasta que el fruto alcance 1 cm de diámetro, o cada 12-18 días en estadios posteriores, en un vol. de caldo de 2.000 l/ha. No superar un gasto de 0,3 l/ha. |
| Melocotonero | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus Monilia, Monilinia spp. Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 0,02 - 0,03 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones preventivas/campaña con un intervalo de 7-21 días, entre el hinchado de las yemas y el endurecimiento del hueso, en un vol. de caldo de 1.500-2.200 l/ha. No superar un gasto de 0,45 l/ha. |
| Níspero, níspero del Japón | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0,02 % | Efectuar un máximo de 4 apl./campaña con un intervalo de 10 días a partir del hinchado de las yemas hasta que el fruto alcance 1 cm de diámetro, o cada 12-18 días en estadios posteriores, en un vol. de caldo de 1.500 l/ha. No superar un gasto de 0,3 l/ha. |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 0,06 % | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, exclusivamente en primavera, con un intervalo de 14-21 días, en un volumen de caldo de 800 l/ha. En caso de mezclar con productos cúpricos, rebajar la dosis a 0,01%. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Patata | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 0,5 - 0,6 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones, con un intervalo de 10-15 días, en un volumen de caldo entre 400-800 l/ha. No superar un gasto de 0,6 l/ha. |
| Pepino | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Podosphaera fuliginea | 0,05 - 0,064 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 8 días, en un volumen de caldo entre 400-800 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Peral | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina Roya del peral, Gymnosporangium sabinae Septoriosis del peral, Septoria pyricola | 0,02 % | Efectuar un máximo de 4 apl./campaña con un intervalo de 10 días a partir del hinchado de las yemas hasta que el fruto alcance 1 cm de diámetro, o cada 12-18 días en estadios posteriores, en un vol. de caldo de 1.500 l/ha. No superar un gasto de 0,3 l/ha. |
| Pimiento | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,05 - 0,064 % | Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días, en un volumen de caldo entre 500-1.200 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Puerro | Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 12 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Remolacha azucarera | Cercosporiosis de la remolacha, Cercospora beticola Oídio de la remolacha, Erysiphe betae Cercosporiosis de la remolacha, Cercospora beticola | 0,3 l/ha | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 21-28 días, en un volumen de caldo entre 500-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,3 l/ha. |

| | | | |
|-------------------|---|----------------|--|
| Remolacha de mesa | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,3 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 21-28 días, desde BBCH 28 a BBCH 49 en un volumen de caldo entre 500-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,3 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Repollo | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae | 0,05 - 0,064 % | Aire libre. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días, en un volumen de caldo entre 400-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Rosales | Oídio del rosál, Podosphaera pannosa Roya del rosál, Phragmidium mucronatum | 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, en un volumen de caldo entre 500-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Tomate | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Alternariosis de la remolacha, Alternaria alternata Cladosporiosis del tomate, Fulvia fulva Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,05 - 0,064 % | Aire libre e invernadero. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días, en un volumen de caldo entre 500-1.200 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Vid | Black rot, podredumbre negra de la vid, Phyllosticta ampelícida Oidio de la vid, Erysiphe necator | 0,02 - 0,024 % | Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días, en un volumen de caldo entre 800-1.000 l/ha. No superar un gasto de 0,2 l/ha. |
| Zanahoria | Alternaria spp. | 0,03 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10-15 días, en un volumen de caldo entre 100-500 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |
| Zarzamoras | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis Roya de la zarzamora, Phragmidium violaceum | 0,02 - 0,05 % | Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días, en un volumen de caldo entre 500-1.200 l/ha. No superar un gasto de 0,5 l/ha. |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO | P.S. (días) |
|--|-------------|
| Frambueso, Fresal, Hinojo, Pepino, Zarzamoras | 3 |
| Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Endrino, Guisante verde, Haba verde, Judía verde, Melocotonero, Pimiento, Tomate | 7 |
| Alcachofa, Apio, Brécol, Caqui, Cardo, Chirivía, Lechuga y similares, Manzano, Níspero, níspero del Japón, Peral, Repollo, Zanahoria | 14 |
| Puerro, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Vid | 21 |
| Almendro | 28 |
| Olivo, Patata | 30 |
| Caqui, Clavel, Dalia, Espárrago, Rosales | NP |

Condiciones Generales de Uso



Aplicar en pulverización normal con tractor para los usos profesionales y al aire libre, y además, en viña, caqui, olivo y ornamentales, también en pulverización manual.
 Aplicar manualmente para los usos en jardinería exterior doméstica.
 En el caso de aplicaciones en invernadero (solo uso profesional) aplicar mediante pulverización manual, instalaciones fijas automatizadas o pulverizadores hidroneumáticos tipo cañón atomizador.
 En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias/oportunas para la correcta aplicación del producto. Asimismo se informará de la probabilidad de aparición de resistencias y se propondrán las estrategias de prevención y manejo de las mismas.
 En caso de identificar alteración a nivel de sensibilidad en las plagas clave, se comunicará a las Autoridades Competentes.

Clase de Usuario

Uso profesional y no profesional. Autorizado para jardinería exterior doméstica.



Mitigación de riesgos en la manipulación

Uso profesional:
El operador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo, siempre y cuando el tractor carezca de cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire. En aplicaciones en invernadero el operador deberá utilizar guantes de protección química y ropa de protección química tipo 6.



SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado



| | |
|--|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Irritación ocular. Categoría 2. Peligro por aspiración. Categoría 1. |
| Pictograma | GHS07 (signo de exclamación) GHS08 (peligro para la salud) |
| Palabra de Advertencia | Peligro |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH 066 -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H319 -Provoca irritación ocular grave. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| Consejos de Prudencia | P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P301+P310 -EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica). P331 -NO provocar el vómito. P337+P313 -Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m en frutales de pepita, caqui, frutales de hueso, almendro; 20 m o 10 m con boquillas de reducción de la deriva del 75% en olivo; 10 m en viñedo; 10 m con cubierta vegetal en hortalizas de hoja, de raíz, de fruto, patata, fresa y ornamentales, 5 m en remolacha, hasta la masa de agua superficial.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

Autorizado para parques y jardines según las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre.

En la etiqueta deberá indicarse que "contiene nafta disolvente del petróleo (nº CAS: 64742-94-5)". La Nafta disolvente del petróleo debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

En la etiqueta de este producto se deberá incluir en la leyenda "autorizado su uso para jardinería exterior doméstica", en caracteres preferentemente visibles.

Para los usos en jardinería exterior doméstica y en aquellas zonas destinadas al uso público en general, se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Para jardinería exterior doméstica la capacidad del envase no excederá los 500 ml.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

(*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización; almendro, remolacha de mesa y caqui, tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta."